


# Erfaringer med biverknader hos SuperSmolt-fisk 2006 og 2007

I løpet av 2006 og til og med oktober 2007 har om lag 6 millioner fisk vorte smoltifisert ved hjelp av SuperSmolt-metoden i Noreg. Sidan 2001 har det på verdsbasis vorte smolta om lag 60 millioner fisk ved hjelp av teknologien.

Me har prøvd å lage ein enkel statistikk på våre erfaringar med biverknader per 18. oktober 2007. Me manglar ein del data for 2007 enno på grunn av at enkelte anlegg ikkje har starta programmet enno eller at dei er midt i programmet.

I tradisjonell produksjon av settefisk vil ein finne variasjon mellom ulike settefiskanlegg, fiskegrupper og ulike vaksiner. Den same variasjonen finn ein også i samanheng med SuperSmolt-teknologien.

Så langt ser ikkje ACD noko trend som tilseier at SuperSmolt-teknologien disponerer for høggradige biverknader. Dette stemmer også med MariCal sine observasjonar frå andre lakseproduserande land.



Figur 1. Biverknader (Speilbergskalaen 0-6) hjå SS fisk etter vaksining i 2007

ACD Pharmaceuticals AS  
Serviceboks 9, 6025 ÅLESUND  
TLF +47 70 32 92 40/ + 47 91 34 65 16  
[post@acdpharma.com](mailto:post@acdpharma.com)

